



## INSTRUCCIONES POST-OPERATIVAS

Su tratamiento de endodoncia a finalizado. Despues de su tratamiento, seguir lo siguiente:

- **Regrese donde su dentista general para la restauracion permanente de su diente inmediatamente, pero no espere mas de 30 dias.**
- No coma nada hasta que los efectos de la anestesia hayan desvanecido.
- **Es normal tener sensibilidad y/o dolor en su diente, mandibula, y el area alrededor de su diente por algun tiempo debido a las inyecciones y/o manipulacion durante el tratamiento.**
- Tome oralmente 600-800mg de ibuprofeno (Advil/Motrin) o 1000mg de acetaminofeno (Tylenol) cada 6-8 hrs, junto con su antibiotico (si es que se le precibio uno) Si esto no resuelve sus sintomas, por favor tome la medicina para el dolor, si se le prescribio alguna.
- Puede ser que el diente que recibio tratamiento se sienta sensible cuando lo toque o al morder. Tal vez se sienta "diferente" algunas veces, pudiendo durar hasta por 4 meses.
- Abstengase de morder o mascar con el diente que recibio tratamiento hasta que su dentista general haya puesto la restauracion permanente. Su diente se podra sentir aspero hasta que esto ocurra.
- Continúe cepillandose y usando el hilo dental regularmente.

Contacte nuestra oficina rapidamente si algo de lo siguiente ocurre:

- Alguna hinchazon visible dentro o fuera de la boca
- Dolor o presion severo que dure mas de 5 dias; o
- Alguna reaccion alergica a algun medicamento, incluyendo urticarias, sarpullido, picazon o dificultad al respirar (nausea NO es una reaccion alergica)
- Es normal que una capa del relleno temporal se caiga. Si ud. cree que a perdido todo el relleno temporal, por favor contactenos.

Los telefonos de la oficina se contestan dia y noche. Si nos tiene que llamar despues que la oficina cerro, por favor tenga el numero de su farmacia disponible.

**Downtown Orlando Ph: 407-423-7667 F: 407-425-8629**

**OrlandoRootCanals.com**